

# INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

---

## **Amoxicilina**

(Nombres comerciales: Amoxil, Polymox, Trimox, otros)

Recomendaciones posológicas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

---

### **¿Para qué se emplea este medicamento?**

- se usa para tratar infecciones bacterianas (antibiótico)

### **¿Cómo debo darle el medicamento a mi hijo?**

- Dé amoxicilina en un horario regular como lo recetó el médico del niño. Esta medicina debe darse solamente al paciente para quien fue recetada.
- Administre toda la medicina. No deje de dársela, aunque su niño se sienta mejor, la infección podría empezar de nuevo.
- Si le da al niño un líquido, agite bien la botella y mida cuidadosamente cada dosis con una jeringa oral, gotero o cuchara para medicina.
- Amoxicilina puede darse con comida o leche para evitar malestar estomacal.

### **¿Cómo debe guardarse este medicamento?**

- Mantenga la medicina en su envase original.
- Mantenga todo medicamento lejos del alcance de los niños.
- Guarde las pastillas o cápsulas en un lugar fresco y seco lejos de la luz del sol.
- La amoxicilina en líquido debe guardarse en el refrigerador. No lo congele.
- Revise la fecha de vencimiento. No use amoxicilina después de la fecha de vencimiento. No guarde amoxicilina para usarla para otra infección.

### **¿Qué debo hacer si olvido una dosis?**

- Dé la dosis tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi hora para la siguiente dosis, no le dé la dosis olvidada. No dé una dosis doble.

### **¿Qué precauciones o instrucciones especiales debo conocer?**

- No le dé al niño esta medicina si es alérgico a penicilinas o cefalosporinas.
- No le dé al niño ninguna otra medicina, incluyendo las medicinas sin receta, hasta que lo haya consultado primero con el médico o farmacéutico del niño.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de este medicamento?**

- diarrea moderada
- náusea y vómito moderados

### **Deje de darle el medicamento a su hijo y llame de inmediato al médico si el niño tiene alguna de las siguientes reacciones:**

- Su niño tiene cualquiera de estas reacciones:
  - diarrea severa
  - náusea y vómito severos
  - erupción en la piel, comezón, urticaria
  - falta de aire, respiración con silbido
  - hinchazón de las manos, pies o cara

### **Notas e instrucciones especiales:**

**Este folleto sobre el medicamento es un resumen y sólo tiene fines informativos. Si tiene alguna otra pregunta, por favor consulte al médico de su hijo o al farmacéutico.**

---

---