

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

Carbamazepina

(Nombres comerciales: Tegretol, otros)

Recomendaciones posológicas: _____

¿Para qué se emplea este medicamento?

- se usa para evitar o tratar ataques (convulsiones)
- se usa para evitar algunos tipos de dolor

¿Cómo debo darle el medicamento a mi hijo?

- Dé solamente la cantidad recetada por el médico del niño. Esta medicina debe darse solamente al paciente para quien fue recetada. No deje de darle al niño carbamazepina a menos que así se lo indique su médico. Dé carbamazepina a la misma hora todos los días.
- Si le da al niño un líquido, agite bien la botella y mida cuidadosamente cada dosis con una jeringa oral, gotero o cuchara para medicina.
- Si le da al niño tabletas de liberación controlada (de acción prolongada), no las triture y no permita que el niño las mastique.
- Carbamazepina puede darse con comida o leche para evitar malestar estomacal.

¿Cómo debe guardarse este medicamento?

- Mantenga la medicina en su envase original y lejos del alcance de los niños.
- Guárdese en un lugar fresco y seco y lejos de la luz del sol.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

- Dé la dosis tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi hora para la siguiente dosis, no le dé la dosis olvidada. No dé una dosis doble. Se olvidó dos o más dosis, comuníquese con el médico del niño.

¿Qué precauciones o instrucciones especiales debo conocer?

- Acuda a todas las citas con el médico del niño. Será necesario que le tomen muestras de sangre para ajustar la dosis y asegurarse que carbamazepina no le está causando efectos secundarios serios.
- No le dé al niño ninguna otra medicina, incluyendo las medicinas sin receta, hasta que lo haya consultado primero con el médico o farmacéutico del niño.
- Esta medicina puede causarle al niño somnolencia. Vigile cuidadosamente si el niño realiza tareas que requieran que esté alerta, tal como subir las escaleras.
- Carbamazepina puede hacer la piel del niño más sensible al sol. Vista al niño con ropa que lo proteja y aplique una crema con protector para el sol.
- Puede ser útil mantener un registro de los ataques, conducta, y desempeño escolar del niño para ayudar a identificar la mejor dosis para él.

¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de este medicamento?

- mareos, somnolencia, irritabilidad, vista borrosa
- boca seca (en niños mayores, use dulce de caramelo macizo o cubitos de hielo para mantener la boca húmeda)
- náusea, vómito, dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea o estreñimiento

Deje de darle el medicamento a su hijo y llame de inmediato al médico si el niño tiene alguna de las siguientes reacciones:

- Cualquiera de los efectos secundarios comunes de la lista de arriba se vuelven severos.
- Su niño tiene cualquiera de estas reacciones:
 - falta de coordinación, movimientos anormales
 - dificultad para ver o hablar
 - fiebre, dolor de garganta, llagas en la boca
 - contusiones anormales o sangrado
 - erupción o manchas moradas en la piel
 - amarillamiento de los ojos o piel
 - palpitaciones o un latido cardíaco rápido
 - un cambio en el patrón de los ataques

Notas e instrucciones especiales:

Este folleto sobre el medicamento es un resumen y sólo tiene fines informativos. Si tiene alguna otra pregunta, por favor consulte al médico de su hijo o al farmacéutico.
