

# INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

---

## Lamotrigina

(Nombre comercial: Lamictal)

Recomendaciones posológicas: \_\_\_\_\_

---

### ¿Para qué se emplea este medicamento?

- para tratar o prevenir convulsiones
- para tratar los trastornos bipolares

### ¿Cómo debo darle el medicamento a mi hijo?

- Debe darle sólo la dosis prescrita por el médico. Se le debe administrar este medicamento únicamente al paciente a quien se le prescribe.
- No deje de administrarle la lamotrigina a menos que así se lo indique el médico de su hijo. Administre la lamotrigina todos los días a la misma hora.
- Si su hijo recibe una formulación líquida, agite bien el frasco y mida cada dosis cuidadosamente con una jeringa oral, un gotero o una cuchara dosificadora.

### ¿Cómo debe guardarse este medicamento?

- Mantenga el medicamento en su envase original.
- Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Guarde los comprimidos en un lugar seco y fresco protegido de la luz solar.
- Si su hijo recibe una formulación líquida, pregúntele al farmacéutico cómo guardarla.

### ¿Qué debo hacer si me olvido de una dosis?

- Administre la dosis en cuanto lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la siguiente dosis, no administre la dosis omitida. No administre una dosis doble. Si se omite la administración de dos o más dosis, comuníquese con el médico de su hijo.

### ¿Qué precauciones o instrucciones especiales debo conocer?

- Los niños tienen más propensión al desarrollo de lesiones cutáneas graves a consecuencia de la lamotrigina que los adultos. Comunique cualquier erupción o lesión cutánea al médico.
- No le dé a su hijo ningún otro medicamento, ni siquiera medicamentos de venta sin receta, sin antes consultar al médico o farmacéutico.
- Este medicamento puede dar somnolencia. Preste especial atención cuando su hijo realice alguna tarea que le exija estar alerta, como subir escaleras.
- La lamotrigina puede volver la piel de su hijo más sensible al sol. Vístalo con ropa de protección y aplíquele una loción con pantalla solar.
- Es conveniente llevar un registro de las convulsiones, la conducta y el rendimiento de su hijo en la escuela para poder identificar la mejor dosis para él.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de este medicamento?

- mareo, aturdimiento, somnolencia
- falta de coordinación
- náuseas, vómitos
- cefaleas

### Deje de darle el medicamento a su hijo y llame de inmediato al médico si:

- Cualquiera de los efectos secundarios comunes enumerados arriba se agrava.
- Su hijo tiene alguna de estas reacciones:
  - sarpullido o manchas purpúreas en la piel
  - coloración amarillenta de los ojos o la piel
  - fiebre, escalofríos, dolor de garganta
  - dificultades visuales
  - hemorragias o magulladuras inusuales
  - cambio en el patrón de las convulsiones

### Notas e instrucciones especiales:

**Este folleto sobre el medicamento es un resumen y sólo tiene fines informativos. Si tiene alguna otra pregunta, por favor consulte al médico de su hijo o al farmacéutico.**

---