

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

Metilfenidato

(Nombres comerciales: Ritalin, otros)

Recomendaciones posológicas: _____

¿Para qué se emplea este medicamento?

- se usa en el tratamiento de niños con trastorno de déficit de atención/hiperactividad
- se usa para tratar la narcolepsia

¿Cómo debo darle el medicamento a mi hijo?

- Dé esta medicina en un horario regular como lo recetó el médico del niño. Esta medicina debe darse solamente al paciente para quien fue recetada.
- No deje de darle al niño metilfenidato a menos que así se lo indique su médico.
- Si da una pastilla de liberación controlada (de acción prolongada), no permita que el niño las mastique o las triture.

¿Cómo debe guardarse este medicamento?

- Mantenga la medicina en su envase original.
- Mantenga todo medicamento lejos del alcance de los niños.
- Guárdese en un lugar fresco y seco y lejos de la luz del sol.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

- Dé la dosis tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi hora para la siguiente dosis, no le dé la dosis olvidada. No dé una dosis doble.

¿Qué precauciones o instrucciones especiales debo conocer?

- No le dé al niño ninguna otra medicina, incluyendo las medicinas sin receta, hasta que lo haya consultado primero con el médico o farmacéutico del niño.
- La receta del niño puede surtirse sólo una vez. El médico del niño necesita darle una nueva receta cada vez.
- Esta medicina puede causar mareos en el niño. Vigile cuidadosamente si el niño realiza tareas que requieran que esté alerta, tal como subir las escaleras. Los mareos deben disminuir a medida que el niño siga tomando metilfenidato.
- Metilfenidato puede aumentar la frecuencia de ataques en niños con trastornos de ataques. Si el niño tiene un trastorno de ataques, hable con el médico del niño sobre los beneficios y riesgos de usar metilfenidato.

¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de este medicamento?

- nerviosismo
- dificultad para dormir
- cambio de apetito

Deje de darle el medicamento a su hijo y llame de inmediato al médico si el niño tiene alguna de las siguientes reacciones:

- Su niño tiene cualquiera de estas reacciones:
 - erupción en la piel
 - fiebre, dolor de garganta
 - exceso de mareos o somnolencia
 - contusiones anormales o sangrado
 - palpitaciones o un latido cardíaco rápido
 - tics, o empeoramiento de tics

Notas e instrucciones especiales:

Este folleto sobre el medicamento es un resumen y sólo tiene fines informativos. Si tiene alguna otra pregunta, por favor consulte al médico de su hijo o al farmacéutico.
