

# MEDICATION INFORMATION FOR PEDIATRIC PATIENTS

---

## Acetaminophen

(Brand Names: Tylenol, Panadol, others)

Dosing Instructions: \_\_\_\_\_

---

### What is this medicine for?

- used to relieve pain
- used to reduce fever

### How should I give my child this medicine?

- Give only the amount recommended by your child’s doctor or on the package label.
- Your child should not take acetaminophen more than 5 times in 1 day or for more than 3 days without the supervision of your child’s doctor.
- If giving your child a liquid, carefully measure each dose using an oral syringe, dropper, or medicine spoon. The drops can be placed directly into your child’s mouth or mixed with water, milk, or juice.
- If giving your child a suppository, follow these instructions:
  - If the suppository seems too soft to use, chill it under cold water or in the refrigerator.
  - Remove the foil wrapper and moisten the suppository with water.
  - Have your child lie down on his or her side, pulling knees up to the chest.
  - Insert the suppository into the rectum ½" to 1" and hold in place for 1 minute.
  - Have your child remain lying down for 10 to 15 minutes.

### How should this medicine be stored?

- Keep medicine in its original bottle.
- Keep all medicine out of the reach of children.
- Store in a cool, dry place away from sunlight.

### What should I do if I miss a dose?

- If you have been instructed to give acetaminophen to your child on a regular schedule, give the dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, do not give the missed dose. Do not give your child a double dose.

### What precautions or special instructions should I know about?

- Many different types and strengths of acetaminophen are available. Be sure to check the appropriate dosing instructions for your child’s age and weight. If you are unsure of the correct dose, check with your child’s doctor or pharmacist.
- Check the labels of all over-the-counter medicines you give your child to be sure they do not contain acetaminophen. An overdose may be harmful. Check with your pharmacist if you have any questions.
- Some acetaminophen liquid products contain alcohol.

### What are the common side effects of this medicine?

- Acetaminophen rarely causes side effects with normal use.

### Stop giving your child this medicine and call your child’s doctor immediately if:

- You think you have given your child too much acetaminophen.
- Your child has any of these reactions:
  - diarrhea
  - excessive sweating
  - loss of appetite
  - nausea or vomiting
  - stomach pain or cramps
  - unusual bleeding or bruising
  - skin rash, hives, or itching

### Notes and Special Instructions:

**This medication information sheet is a summary and intended for information purposes only. If you have any other questions, please ask your child’s doctor or pharmacist.**

---

# INFORMACIÓN MÉDICA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

---

## Acetaminofen

(Nombres comerciales: Tylenol, Panadol, otros)

Instrucciones de dosificación: \_\_\_\_\_

---

### ¿Para qué se emplea este medicamento?

- alivia el dolor
- baja la fiebre

### ¿Cómo debo darle el medicamento a mi hijo?

- Dé solamente la cantidad recomendada por el médico o por la etiqueta del paquete.
- El niño no debe tomar acetaminofen más de 5 veces en un 1 día, o por más de 3 días, sin la supervisión del médico del niño.
- Si le da al niño un líquido, mida cuidadosamente cada dosis con una jeringa oral, gotero o cuchara para medicina. Las gotas pueden colocarse directamente en la boca del niño o ser mezcladas con agua, leche o jugo.
- Si le da al niño un supositorio, siga estas instrucciones:
  - Si el supositorio parece demasiado blando para usarse, enfríelo bajo agua fría o en el refrigerador.
  - Quite el papel de aluminio y humedezca el supositorio con agua.
  - Haga que su niño se acueste de lado, con las rodillas levantadas hacia el pecho.
  - Inserte el supositorio en el recto a 1/2" o 1", y sosténgalo en el lugar por un minuto.
  - Haga que el niño permanezca acostado de 10 a 15 minutos.

### ¿Cómo debe guardarse este medicamento?

- Mantenga la medicina en su envase original.
- Mantenga todo medicamento lejos del alcance de los niños.
- Guárdese en un lugar fresco y seco y lejos de la luz del sol.

### ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

- Si se le indicó darle al niño acetaminofen en un horario regular, déle la dosis tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi hora para la siguiente dosis, no le dé la dosis olvidada. No le dé al niño una dosis doble.

### ¿Qué precauciones o instrucciones especiales debo conocer?

- Hay muchos tipos y fuerzas disponibles de acetaminofen. Asegúrese de leer las instrucciones de las dosis que son las apropiadas para la edad y peso del niño. Si no está seguro de la dosis correcta, consulte a su médico o farmacéutico.
- Lea las etiquetas de las medicinas sin receta que le da al niño para asegurarse que no contienen acetaminofen. Una sobredosis puede ser dañina. Consulte a su farmacéutico si tiene alguna pregunta.
- Algunos productos de acetaminofen en forma de líquido contienen alcohol.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de este medicamento?

- Acetaminofeno raramente causa efectos secundarios con el uso normal.

### Deje de darle el medicamento a su hijo y llame de inmediato al médico si el niño tiene alguna de las siguientes reacciones:

- Usted cree que le ha dado al niño demasiado acetaminofen.
- Su niño tiene cualquiera de estas reacciones:
  - diarrea
  - pérdida de apetito
  - dolor o cólicos estomacales
  - erupción en la piel, urticaria, o comezón
  - exceso de sudor
  - náusea o vómito
  - sangrado anormal o contusiones

### Notas e instrucciones especiales:

**Esta hoja de información sobre el medicamento es un resumen y sólo tiene fines informativos. Si tiene otras preguntas, consulte al médico de su hijo(a) o al farmacéutico.**

---